“ The single biggest threat to man's continued dominance on the planet is the virus ”

– Joshua Lederberg

(Nobelpreis für Medizin, 1958)

-1

1

UND:
Fürchten Sie sich nicht vor Haien....

The World's Deadliest Animals

Number of people killed by animals, 2015

Sources: J.N.M.E. WHO, CooBITE, FAO, Norwegian Institute for Nature Research, International Shark Attack File, National Geographic, PBS, National Science Foundation, CDC, WWF, Wilderness & Environmental Medicine, Nature, French Institute of Research for Development. All calculations have wide error margins.

2

Wo finde ich aktuelle Daten?

- <https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices>
- <https://www.who.int/csr/don/en/>
- <https://ecdc.europa.eu/en/home>
- <https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/yellow-book-home>
- <http://www.promedmail.org/>
- <https://www.healthmap.org/en/>
- NICHT: Kronen-Zeitung....

3

...die wichtigsten Ausbrüche der letzten 3 Jahre...

- **Dengue:** global/Tropen, Fokus SO-Asien; > 100 Mio Fälle jährlich, ongoing
- **Chikungunya:** seit 2015 S-Amerika; > 2 Mio Fälle gesamt, EU-Fälle (!), ongoing mit leichtem Rückgang
- **Ebola:** 2014/2015 W-Afrika; > 28.000 Fälle; beendet, DRC seit 5/2018 erneut aufgetreten > 3.400 Erkrankungen
- **ZIKA:** seit 2015 S-Amerika; > 1 Mio Fälle; abklingend
- **MERS-CoV:** Beginn 2012 saudiarab.HI; bis dato rd.2.300 Fälle, stabil auf niedr. Niveau
- **2019-nCoV:** neuartiges Betacoronavirus, China, > 50.000 Fälle ongoing
- **Gelbfieber:** 2016 Angola: > 3.900 Fälle, beendet, 2017 Brasilien: > 3.500 Verdachtsfälle, 2018 > 6.500 Verdachtsfälle; 2019 Nigeria etc..

4

...die wichtigsten Ausbrüche der letzten 3 Jahre...

- **Masern:** EU-Europa, seit Juni 2016; 2017: ca. 21.000 Fälle; 14 Tote, Rumänien&Italien als hot spots; 2018: 82.500 Fälle; 72 Tote; ongoing
- **Diphtherie:** Yemen, Bangladesh und mehrere tausend Fälle, ongoing
- **Cholera:** Yemen > 2 Mio Fälle; ongoing, DRC und Kenya: lokale Ausbrüche
- ... und viele andere:
 - Polio cVDPV Somalia, Nigeria, DRC, Philippinen....
 - Hepatitis E
 - Pertussis
 - Leishmaniose
 - ...
 - ...

Und:
SARS-CoV2 (COVID-19)

5

Polio

6

Polio-Eradikation 1988-2016

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.
 © WHO 2016. All rights reserved

7

Polio

GLOBAL
POLIO ERADICATION
 INITIATIVE

every last child

<http://www.polioeradication.org/>

1994: Amerika poliofrei

1999: Wild-Poliovirus Typ 2 Transmission erfolgreich gestoppt

2002: Europa poliofrei

2012: WPV3 zuletzt im November in Nigeria nachgewiesen

Sept 2015: WPV2 eradiziert

2019: WPV3 eradiziert

Problem: circulating vaccine derived polioviruses (cVDPV)

Okt 2015: SAGE Entscheidung ab April 2016 bOPV

8

cVDPV

- Entsteht in unterimmunisierten Bevölkerungsgruppen durch langanhaltende Zirkulation (meist über 1 Jahr!) eines OPV-Virus in nicht ausreichend geimpften Personen
- „remutiert“ durch die mehrfachen Humanpassagen zu einem (voll) pathogenen Poliovirus
- Kann durch Nachimmunisierung mit OPV rasch gestoppt werden
- Importe denkbar

9

10

VDPV 2000-2018 (WER 9343, 2018)

Figure 1 Circulating vaccine-derived poliovirus (cVDPV) cases detected worldwide, by serotype, January 2000–June 2018*

Figure 1 Cas de poliovirus circulants dérivés d'une souche vaccinale (PVDV) détectés dans le monde, par sérotype, janvier 2000-juin 2018*

* Data through June 2018 as available by 18 September 2018. – Données jusqu'en juin 2018, disponibles au 18 septembre 2018.

11

Polio-Reiseimpfung: Vorschriften/Empfehlungen

1. **Pflichtimpfung bei Reise >4 Wochen für:**
Wildvirus oder cVDPV1/3-infizierte Länder mit Risiko der internat. Ausbreitung:
dzt. Pakistan, Afghanistan, Nigeria, Indonesien, Malaysia, Myanmar, Philippinen
CAVE: Impfung wird bei Ausreise (!!) kontrolliert, darf nicht älter als 1 Jahr sein!
2. **Impfempfehlung bei Reise > 4 Wochen:**
Mit cVDPV2 infizierte Länder mit Risiko der internat. Ausbreitung:
dzt. Äthiopien, Angola, Benin, Elfenbeinküste, China, Ghana, Kamerun, DRC, Mozambique, Niger, Nigeria, Philippinen, Sambia, Somalia, Togo, Tschad, ZAR
3. **Impfempfehlung allgemein:**
Nichtinfizierte, aber gefährdete Länder:
dzt. Kenia, Papua Neuguinea

12

temporäre Polioimpfpflicht - Dokumentation

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR PROPHYLAXIS
Certificat international de vaccination ou de prophylaxie

This certificate is issued to **Jane Mary Doe** (1) **20 March 1960** (2) **F** (3) **United States** (4)
Name of bearer and (Date of birth) (Sex) (Country of birth)

Passport number: _____ (Where applicable, indicate if this document is a duplicate) **Jane Mary Doe** (3)
(Passport identification document) (If applicable, indicate if this document is a duplicate) (Name of bearer or holder as it appears on his/her passport)

Has the bearer received these vaccinations or prophylaxis against **Polio** (4) _____ (Indicate with the letter 'A' for 'Yes', 'B' for 'No', 'C' for 'Not known', 'D' for 'Not applicable', 'E' for 'Not recorded', 'F' for 'Not given')

Number of injections given or type of prophylaxis	Date	Signature and professional status of vaccinator or prophylaxist	Manufacturer and name of vaccine or prophylaxis	Certificate valid for	Official stamp of the administering centre
5 Polio (IPV)	6 16 June 2024	7 John M. Smith, MD	8 [Batch for lot] 6	9 18 July 2024 18 June 2025	[]

www.cdc.gov

13

13

Gelbfieber

Details bei Reiseimpfungen

14

SARS, MERS, nCoV

Das Coronavirus-Kartell...

15

16

MERS CoV

Middle East Respiratory Syndrome
Coronavirus

17

MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome)

- Respiratorische Coronaviruserkrankung
- Zunächst Einzelfälle, dann sukzessive Ausbreitung nahezu auf die gesamte arabische Halbinsel, v.a. Saudi-Arabien
- Anfangs kaum Sekundärfälle, später Trendumkehr: 75% sekundär → human-human Übertragung; v.a. im HCW Bereich und intrafamiliär
- mittlere Infektiosität: $R_0 \sim 2.5$
- Geringe Manifestationsrate (tiefe Lungenabschnitte müssen erreicht werden)
- Typische „Clusterbildung“
- Von 3/2012 bis 3/2020 2554 Fälle/924 Tote (36%)
- Exporte anfangs in viele weitere Länder
- Etablierung einer Infektkette ausserhalb SA-Halbinsel: Süd-Korea (Ausbruch August 2015 beendet)
- Reservoir: Dromedare, ev. auch Fledermausarten
- Nur mehr sporadisches Auftreten mit ca 10 Erkrankungen pro Monat seit 2019

18

Risikofaktoren für Übertragung

Risk factors for primary MERS-CoV

Substantial risk factors among camel workers in Qatar¹⁸

- Camel training
- Milking camels
- Having respiratory symptoms requiring overnight stay in hospital
- Contact with camel waste
- Poor hand hygiene before and after contact with camels

Independent risk factors of primary MERS-CoV infection in Saudi Arabia¹⁹

- Direct dromedary exposure in the 2 weeks before illness onset (adjusted odds ratio [OR] 7.45; 95% CI 1.57–35.28)
- Diabetes (adjusted OR 6.99; 95% CI 1.89–25.86)
- Heart disease (adjusted OR 6.87; 95% CI 1.81–25.99)
- Currently smoking tobacco (adjusted OR 6.84; 95% CI 1.68–27.94).
- Direct physical contact with dromedaries in the previous 6 months (adjusted OR 14.59; 95% CI 2.38–89.55)

Risk factors for household transmission²⁰

- Sleeping in an index patient's room (risk ratio [RR] 4.1; 95% CI 1.5–11.2)
- Removing patient's waste: urine, stool, and sputum (RR 3.2; 95% CI 1.2–8.4)
- Touching respiratory secretions from an index patient (RR 4.0; 95% CI 1.6–9.8)

Hui et al, LID 2018

19

Transmission chain of confirmed cases of MERS-CoV in Wadi Aldwasir, Saudi Arabia, by week of disease onset, weeks 2–7, 2019 (n=35)

* Following the admission of this patient in Hospital A, several new cases in contact with this hospital have been identified.

Typischer Transmissionsverlauf bei MERS-CoV Infektionen

20

21

22

23

24

MERS-CoV

(Middle East Respiratory Syndrome)

Beurteilung:

- Wenig relevant im internationalen Reiseverkehr
- Einzelimporte sind denkbar
- Seuchenhygienisch weitgehend unbedeutend, relativ wenig infektiös
- Jedoch: HCW-Übertragung ist bedeutsam bei importierten Einzelfällen
- *Reiseanamnese ist immens wichtig!*

Experimentelle Impfung für Kamele im klinischen Test zu 100% wirksam.
(adjuvanted MERS-CoV Spike protein subunit vaccine, *Viruses* 2019 11 (3):212)

25

Impfstoffe

26

MERS-Kandidatimpfstoffe

Kandidaten (in unmittelbarer Nähe zur klin. Prüfung, alle: S-Protein-Vakzinen):

- Rekombinante Masernvakzine (MERS-S Glykoprot.)
- Schimpansen-Adenovirus
- MVA-Vektorvakzine (S-Protein)

Ev. prime-boost mit 2 differenten Impfstoffkandidaten (vgl. Ebola: Ad26 prime - MVA-BN-Filo booster)

Modjarrad et al LID 2019

27

MERS-Kandidatimpfstoff in P I

DNA Impfstoff (WRAIR) Resultate:

- Keine AE-Probleme, geringe Lokalreaktionen
- Gute Immunogenität, sowohl humoral (S1 bindende AK) als auch zellulär (CD8+) bis 1 Jahr postvakzinal
- Immunreaktionen qualitativ ähnlich jener in Seren gesunder MERS-Patienten. Titer deutlich niedriger
- Keine Efficacy Daten

Modjarrad et al LID 2019

28

ChAdOx1-Vektorenvakzinen

More than 250 volunteers have been vaccinated with ChAdOx1 vectored vaccines

Flu: 84
TB: 42
Cancer: 34
Malaria: 13
MenB: 27
Chik: 24

Plus Zika,
2 dose MERS
Studies now underway

Country	Trial	Vaccine	Age	Route	Dose	Number (received ChAdOx1)		
UK	FLU004	ChAdOx1 NP+M1	18-50	IM	5x10 ⁸ vp	3		
					5x10 ⁹ vp	3		
					2.5x10 ¹⁰ vp	3		
UK	FLU005	ChAdOx1 NP+M1	18-50	IM	2.5x10 ¹⁰ vp	12		
		MVA NP+M1 (week 8)			2.5x10 ¹⁰ vp	12		
		ChAdOx1 NP+M1			18-50	IM	2.5x10 ¹⁰ vp	12
		MVA NP+M1 (week 52)						
		ChAdOx1 NP+M1 (week 8)			18-50	IM	2.5x10 ¹⁰ vp	12
		MVA NP+M1						
		ChAdOx1 NP+M1 (week 52)			>50	IM	2.5x10 ¹⁰ vp	12
		MVA NP+M1						
		ChAdOx1 NP+M1 (week 8)			>50	IM	2.5x10 ¹⁰ vp	12
		MVA NP+M1						
UK	TB034	ChAdOx1 85A	18-50	IM	5x10 ⁸ vp	6		
		ChAdOx1 85A			2.5x10 ¹⁰ vp	12		
		MVA85A (week 8)			2.5x10 ¹⁰ vp	12		
		ChAdOx1 85A (x2, 4 weeks apart)			2.5x10 ¹⁰ vp	12		
UK	VANCE01	ChAdOx1.5T4	18-75	IM	2.5x10 ¹⁰ vp	34		
UK	VAC067	ChAdOx1 LS2	18-45	IM	5x10 ⁹ vp	3		
					2.5x10 ¹⁰ vp	10		
UK	MERS001	ChAdOx1 MERS	18-50	IM	5x10 ⁹ vp	6		
					2.5x10 ¹⁰ vp	9		
UK	VAMB0X	ChAdOx1 MenB.1	18-50	IM	5x10 ⁹ vp	3		
					5x10 ¹⁰ vp	24		

Courtesy: S. Gilbert, Oxford

29

SARS-CoV2/COVID-19

30

SCIENCE

FRIDAY, MAY 30, 1919

CONTENTS

The Lessons of the Pandemic: MAJOR GEORGE A. SOPER 501

The Freas System: DR. W. L. ESTABROOKE ... 506

Organization Meeting of the American Section of the Proposed International Astronomical Union: PROFESSOR JOEL STEBBINS 508

Scientific Events:—

War Researches at St. Andrews University; The Department of Bacteriology and Public Health at Yale University; Base Hospital, No. 21, of the Washington University School of Medicine; The Chemical Warfare Service; The Division of Applied Psychology of the Carnegie Institute of Technology 510

Scientific Notes and News 513

University and Educational News 515

THE LESSONS OF THE PANDEMIC

The pandemic which has just swept round the earth has been without precedent. There have been more deadly epidemics, but they have been more circumscribed; there have been epidemics almost as widespread, but they have been less deadly. Floods, famines, earthquakes and volcanic eruptions have all written their stories in terms of human destruction almost too terrible for comprehension, yet never before has there been a catastrophe at once so sudden, so devastating and so universal.

The most astonishing thing about the pandemic was the complete mystery which surrounded it. Nobody seemed to know what the disease was, where it came from or how to stop it. Anxious minds are inquiring to-day whether another wave of it will come again.

The fact is that although influenza is one of the oldest known of the epidemic diseases, it is the least understood. Science, which by

31

Woher kommt SARS-CoV2

32

Die „Harmlosen“: Endemische Coronaviren

33

Österreich

Vorkommen von respiratorischen Coronaviren Nachweis 2009-2019 am Zentrum für Virologie (n=135)

Altersverteilung:

33% jünger als 1 Jahr
48% jünger als 3 Jahre
13% älter als 60

Courtesy: E. Puchhammer-Stöckl, Wien

34

Diagnostik

35

SARS-CoV2: Diagnostik

Courtesy: E. Puchhammer-Stöckl, Wien

36

COVID-19: Tests für Akutdiagnostik

- Real-time reverse transcription polymerase chain reaction (rRT-PCR), verwendet
 - 3 Primer und Probensets um drei Regionen im SARS-CoV2 Nukleokapsid (N)
 - Und 1 Primer und Probenset für humane Rnase P (RP) in einer Probe zu identifizieren
- Abstriche aus Nasopharynx (besonders am Infektionsbeginn) oder Sputum (im späteren Verlauf, sowie BAL)
- Reverse Transkription in cDNA, Amplifikation, Fluoreszenzablesung
- Positiv- und Negativkontrolle läuft mit
- Sehr sensitiv, sehr spezifisch, falsch positiv in wenigen Fällen (<5%)
- Virusausscheidung: 1-2 Tage vor bis 10-14 Tage (in schweren Fällen länger) nach Symptombeginn

37

COVID-19: Tests für Diagnostik und Prävalenz

- Für die Bestimmung unerkannter (weil asymptomatischer) Fälle eignen sich in erster Linie Immunoassays
- Vielzahl von Tests verfügbar (>>100!!), meist ELISA
 - Tests auf virale Antigene (noch nicht verfügbar)
 - IgM, IgG oder Kombi-Tests (cave: erst ab dem 7.-10. Tag positiv)
 - Rapid diagnostic tests (tw. auch mit Influenza), tw. immunchromatografisch
- Haken: Tests meist nicht validiert, Spezifität schwankt sehr stark (tw. unter 85%)
- Liste: <https://www.finddx.org/covid-19/pipeline/>

38

Einsatz von AK-Schnelltests

Personengruppe	Empfehlung für AK-Schnelltests auf Personenebene	Interpretation eines pos. Ergebnisses	Interpretation eines neg. Ergebnisses
Testung von Menschen mit COVID19- artigen Infektzeichen	Empfehlung für AK-Schnelltests nicht gegeben. Personen sollen sofort mit PCR-Test getestet werden.	Wahrscheinlichkeit für falsch positives Ergebnis ist gegeben, daher Verifizierung durch PCR-Test notwendig! Quarantäne bis zur Bestätigung.	Wahrscheinlichkeit für falsch negatives Ergebnis gegeben und gefährlich. AK- Schnelltests erfassen Infektionen erst ab 5-10 Tag der Infektion. Verifizierung durch PCR-Test notwendig! Quarantäne bis zur Bestätigung.
Testung von Menschen, die aktuell keine Symptome haben und die vermuten eine COVID19-Infektion durchgemacht zu haben	Empfehlung für AK-Schnelltests nicht gegeben.	Wahrscheinlichkeit für falsch positives Ergebnis schwankt je nach Durchseuchung der Lebensregion zwischen 10 und 80% (!), d.h. große Gefahr, dass sich Menschen in falscher Sicherheit wiegen! D.h. alle Schutzmaßnahmen weiterhin aufrechterhalten und auf validierte Tests warten bzw. Verifizierung des Ergebnisses durch ELISA (wenn verfügbar).	Auch die Wahrscheinlichkeit für falsch negative Ergebnisse ist hier sehr heterogen, ein Hinweis auf noch nicht durchgemachte Infektion bzw. dass die Infektion erst 5-7 Tage zurückliegt, liegt aber vor. D.h. Aufrechterhaltung aller Schutzmaßnahmen wie bisher.
Testung von Menschen, die aktuell keine Symptome haben und auch nie an sich beobachtet haben	Empfehlung für AK-Schnelltests nicht gegeben.	Wahrscheinlichkeit für falsch positives Ergebnis schwankt je nach Durchseuchung der Lebensregion zwischen 10 und 80% (!), d.h. große Gefahr, dass sich Menschen in falscher Sicherheit wiegen! D.h. alle Schutzmaßnahmen weiterhin aufrechterhalten und auf validierte Tests warten bzw. Verifizierung des Ergebnisses durch ELISA (wenn verfügbar).	Auch die Wahrscheinlichkeit für falsch negative Ergebnisse noch vorhanden, ein Hinweis auf noch nicht durchgemachte Infektion bzw. dass die Infektion erst 5-7 Tage zurückliegt, liegt aber vor. D.h. Aufrechterhaltung aller Schutzmaßnahmen wie bisher.

39

Klinik

40

Klinik

- Ro um 2,5 - nicht genau bekannt, Dunkelziffer!
- IKZ 2-14 Tage
- Manifestationsindex 58%
- Überwiegend (>80%) leichte Verläufe mit grippeähnlichen Symptomen
- schwere Verläufe bei < 20%; Pneumonien;
- CFR steigt bei Personen mit Grundkrankheiten (Diabetes, Nierenleiden etc);
 - Letalität 0,2-5/1000 (ähnlich saisonaler Influenza), damit vermutlich deutlich niedriger als für SARS (~10%) oder MERS (~30%)

41

Klinischer Verlauf von COVID-19

42

Symptome

Symptome von Covid-19

43

Klinische Chronologie

Thomas-Rüddel et al., Anaesthesist, 2020

44

45

46

CFR im Vergleich

COVID-19 VS OTHER DISEASES

Estimates suggest the COVID-19 coronavirus is less deadly than the related illnesses SARS or MERS, but more infectious (R_0) than seasonal influenza.

47

Impfstoffe

48

COVID-19: essentials für Impfstoffentwicklung

CoV haben 3 große Gruppen von Proteinen:

- **Spike**: unterteilt in S1 (Rezeptor-Bindungsdomain, variabel) gut immunogen, S2 (mediert Zelleintritt), konserviert, gut immunogen
- **N-Strukturproteine**: Nukleokapsid (N), Matrix (M), Envelope (E)
- **S und N hochimmunogen, gute T-Zell-Antwort**
- **Enzymatisch aktive Proteine**: nsp14, nsp16
 - Beide Gruppen hoch-konserviert, geringe Mutationen möglich

Menachery et al, COV 2017
Zhang et al, Exp. Rev. Vacc. 2014

49

Neutralisierende Antikörperantwort

(Wu, F et al, 2020; 175 genesene Patienten)

Ältere haben höhere NAb-Titer, und zwar in allen gemessenen Kategorien (RBD, S1 und S2 Protein)

50

Potentielle Impfstoffkandidaten für CoV: Stärken und Schwächen

Vaccines	Advantages	Disadvantages
Inactivated and live-attenuated virus vaccines	Inducing potent immune responses and protection against virus challenge; rapid development	Relatively unsafe (having potential of recovering virulence); being inappropriate for highly immunosuppressed individuals
DNA vaccines	Easier to design; safe, minimizing undesirable side effects; stable and inexpensive	Generally inducing lower immune responses; repeated doses may cause toxicity
Viral vector-based vaccines	Eliciting stronger and specific cellular and humoral immune responses	Possibly presenting pre-existing immunity in humans and causing harmful immune responses and inflammation
VLPs	Containing no infectious viruses; possibly being produced in a variety of expression systems; being able to elicit neutralizing antibody responses and protection	Requiring specific antigen-unrelated components for VLP formation; possibly inducing relatively lower immune responses
Subunit vaccines	High safety profile because no infectious materials involved; consistent production; no side effects at infection sites; inducing immune responses with neutralizing activity and/or protection	Not always cost-effective; relatively lower immunogenicity; requiring appropriate adjuvants
• Full-length S protein-based	Inducing humoral and cellular immune responses as well as protection	Having potential to induce harmful immune responses or antibody-mediated disease enhancement effects by the non-neutralizing epitopes
• Receptor-binding domain-based	Eliciting potent neutralizing antibody responses, mucosal immune responses and protection	Requiring suitable adjuvants and appropriate vaccination routes

Zhang et al, ExpRev.Vacc. 2014

51

COVID-19 Entwicklungsprogramme f. Impfstoffe

Technology	Attributes				Candidates in Preclinical Development	Candidates in Phase I
	Single Dose	Licensed Platform	Speed	Current Scale		
DNA	No	No	Fast	Medium	Inovio Pharmaceuticals Takis/Applied DNA Sciences/Eviveax Zyds Cadila	
Inactivated	No	Yes	Medium	Medium to high	Sinovac	
Live attenuated	Yes	Yes	Slow	High	Codagen/Serum Institute of India	
Nonreplicating vector	Yes	No	Medium	High	GenoVax/BravoVax Janssen Pharmaceutical Companies University of Oxford Altimmune Cofrelix Vaxart Egenvaxion	CanSino Biologics (CNC-020009 30906)
Protein subunit	No	Yes	Medium to fast	High	WRHAIR/U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases Clover Biopharmaceuticals Inc./GSK Vaxil Bio AJ Vaccines Genex/EpiVax/University of Georgia Sanofi Pasteur Novavax Heat Biologics/University of Miami University of Queensland/GSK/ Baylor College of Medicine I/Bio/CC-Pharming	
Replicating viral vector	Yes	Yes	Medium	High	Zyds Cadila Institut Pasteur/Therion Zoon Biomed/Therion Research	
RNA	No	No	Fast	Low to medium	Fudan University/Shanghai JiaoTong University/INACure Biopharma China CDC/Tongji University/Stemina Aclaris/Duke-NUS Imperial College London Curevac Boji Tech/Pharx	Moderna/NIAID (vCCT04283461)
Uncertain					University of Pittsburgh University of Saskatchewan ImmunoPrecise MIGAL Galileo Research Institute Doherty Institute Tulane University	

Lurie et al, NEJM,2020

52

ChAdOx1-MERS: Kandidat (auch) für SARS-CoV2-Vakzine?

- Schimpansen-Adenovirus Vektor Plattform
 - Replikationsdefizient (Gendefekt)
 - Apathogen, bislang keinerlei safety-Probleme
 - hoch immunogen (T und B Zellimmunität)
 - Keine „natürliche“ Immunität im Humanbereich auch bei Immunität gegen andere Adenoviren
 - Bereits für viele Antigene im Testlauf (Influenza, RVF, TB, ZIKA, CHIK)
- Ähnliche Schimpansen-Adenovirusvektoren (3,7,6,9,32,33,63,68) existieren bereits experimentell (HIV, Flu, Ebola, SARS, HepC, Rabies, RVF, Malaria)
- Eventuelles boosting mit MVA-Vektor, der gleiche AG exprimiert (prime-boost regimen)
- Sowohl im Human- wie auch Veterinärbereich verwendbar

Morris et al, Future Virol, 2016, Alharbi et al, Nat.sci.rep., 2019

55

SARS-CoV2 mRNA Vakzine

- NIAID funded Studie mit mRNA-Impfstoff (komplettes Spike) von Moderna
- FIM ab 16.3.2020
- 45 Freiwillige, 3 Arme, 2 Impfungen (0-1)

Genetic and Rare Diseases Information Center resources: SARS-CoV-2 Respiratory System	
S.S. FIM Resource	
Areas and Interventions	
<p>Arm 0</p> <p>Experimental Arm 1 20 mcg of mRNA-1273 administered through 0.5 mL intramuscular injection in the deltoid muscle on Days 1 and 29, n=15 (if verified, 11 non-verified)</p>	<p>Interventional Arm 0</p> <p>Biological mRNA-1273 Lipid nanoparticles (LNPs) dispersion containing an mRNA that encodes for the prefusion stabilized spike protein 2019-nCoV mRNA-1273 consists of an mRNA Drug Substance that is manufactured into LNPs composed of the proprietary ionizable lipid, SM-102, and 3 commercially available lipids, cholesterol, DSPC, and PEG2000-DGMS.</p>
<p>Experimental Arm 2 100 mcg of mRNA-1273 administered through 0.5 mL intramuscular injection in the deltoid muscle on Days 1 and 29, n=15 (if verified, 11 non-verified)</p>	<p>Biological mRNA-1273 Lipid nanoparticles (LNPs) dispersion containing an mRNA that encodes for the prefusion stabilized spike protein 2019-nCoV mRNA-1273 consists of an mRNA Drug Substance that is manufactured into LNPs composed of the proprietary ionizable lipid, SM-102, and 3 commercially available lipids, cholesterol, DSPC, and PEG2000-DGMS.</p>
<p>Experimental Arm 3 200 mcg of mRNA-1273 administered through 0.5 mL intramuscular injection in the deltoid muscle on Days 1 and 29, n=15 (if verified, 11 non-verified)</p>	<p>Biological mRNA-1273 Lipid nanoparticles (LNPs) dispersion containing an mRNA that encodes for the prefusion stabilized spike protein 2019-nCoV mRNA-1273 consists of an mRNA Drug Substance that is manufactured into LNPs composed of the proprietary ionizable lipid, SM-102, and 3 commercially available lipids, cholesterol, DSPC, and PEG2000-DGMS.</p>

56

Sanofi -two vaccine approaches for COVID-19

1 Baculovirus recombinant vaccine approach

2 Translate Bio mRNA vaccine approach¹

1. <https://www.sanofi.com/en/investors/financial-results-and-events/investor-presentations/presentation-03-2020>

5

57

SARS-CoV2-Impfstoffe: Ausblick

- Zahlreiche Technologien in Erprobung
- ? „Vaccine enhancement of disease“ (Th2-medierte entzündliche Lungenerkrankung)
- MERS-Impfstoffkandidaten recht vielversprechend – umlegbar auf nCoV bei nur 50% Homologie und anderem Rezeptor??
 - Vektorenvakzinen (insbesondere ChAdOx1):
 - Etablierte, sichere Technologie
 - vermutlich rascher zu entwickeln, leicht zu produzieren
 - Sehr gute Immunogenität
 - Probleme: Vektorimmunität bei wiederholter Gabe?, Sicherheit bei älteren Personen, ADE
 - DNA-Vakzine:
 - Vorteil: vermutlich breit wirksam da gesamtes S-Protein codiert wird
 - Nachteil: Immunantwort mäßig
 - Bisher keine ungewöhnlichen AE's
- Zeitlicher Horizont für SARS-CoV2- Vakzine: 2.Jahreshälfte 2020??

58

Bestimmte Antikörper könnten Erkrankung verstärken: *Original Antigenic Sin*⁽¹⁾

- Wenn **nicht-neutralisierende Antikörper** z.B., an CoV Spike Protein binden, könnte die CoV Interaktion mit dem zellständigen Virus-Rezeptor verstärkt werden, was zu einer **verstärkten Virusaufnahme** führen könnte.
- **Früherer Kontakt** zu anderen CoV-Stämmen könnte Immunantwort gegenüber SARS-Cov-2 beeinflussen (**OAS**)
- Des Weiteren können Ablagerung von **Antigen-Antikörperkomplexen** in Gefäßen zu überschüssiger Komplement-aktivierung, Vaskulitis und Ödembildung führen.

¹⁾ Francis T., Proc Am Philos Soc, 104:572-578, 1960

Perlmans S. et al., Nat Rev Immunol, 5:917-927, 2005

59

EBOLA

60

DRC Ausbruch 2018/2019/2020

- Bislang über 3.400 Erkrankte und rd. 2.250 Tote
- WHO: PHEIC seit 8/2019
- Zahlreiche Distrikte betroffen; Grenzgebiet Uganda als „hot spot“, erste exportierte Fälle nach Uganda
- WHO: zahlreiche „alerts“ im Grenzbereich zu anderen Ländern, bisher unbestätigt
- Zweitgrößter Ausbruch nach Guinea 2014
- Keine Bedeutung für den internat. Reiseverkehr
- Seit Okt.2019 rückläufige Meldungen, seit 3/2020 als „erloschen“ eingestuft
- Impfkampagnen

63

Geographical distribution of confirmed and probable cases of Ebola virus disease, Democratic Republic of the Congo and Uganda as of 3 March 2020

64

64

Filoviren

Tabelle 15.7: Überblick über die Eigenschaften und Funktionen der Filovirusproteine

Protein	Molekulargewicht		Modifikation	Funktion
	Marburgvirus	Ebolavirus		
NP	96 kD	104 kD	phosphoryliert	assoziiert mit dem RNA-Genom, Komponente des Nucleocapsids
VP30 (P)	32 kD	35 kD		Komponente des Nucleocapsids, Bestandteil des Transkriptionskomplexes
L	267 kD	267 kD		RNA-abhängige RNA-Polymerase, Komponente des Nucleocapsids
VP30	28 kD	30 kD		Komponente des Nucleocapsids, phosphoryliert, Funktion unbekannt
VP40 (M)	38 kD	40 kD		Matrixprotein, assoziiert mit innerer Seite der Virusmembran und den Nucleocapsidkomponenten
GP	170 kD	120-150 kD	N-glycosyliert O-glycosyliert	Oberflächen- und Membranprotein, Homotrimer, Adsorption, Induktion neutralisierender Antikörper, wird beim Ebolavirus durch Furinprotease in GP ₁ (140 kD) und GP ₂ (28 kD) gespalten
sGP	-	50 kD	N-glycosyliert O-glycosyliert	asymmetrisches Proteindimer, Furinprotease spaltet Δ -Peptid (10-14 kD) vom carboxyterminalen Ende ab
VP24	24 kD	24 kD		membranassoziiert, Funktion unbekannt

67

Grundlegende Charakteristika der (weitentwickelten) Ebola-Vakzinen

- ChAd3:**
 2 rekombinante, lebende, nicht vermehrungsfähige *Chimpanzee Adenovirus3* Vektoren kodieren das ZEBOV bzw. SEBOV Glykoprotein, monovalent oder bivalent eingesetzt, Einzelpfimpfung
- rVSV-ZEBOV:**
 rekombinantes, lebendes, vermehrungsfähiges *Vesicular Stomatitis Virus*, G-Protein (Pathogenitätsmarker) depletiert und durch G-Protein des ZEBOV ersetzt; Einzelpfimpfung
- Ad26.ZEBOV & MVA-BN-Filo (prime-boost)**
 lebendes, nicht vermehrungsfähiges, rekombinantes Adenovirus Serotyp 26, das GP von ZEBOV exprimiert und MVA-Impfstoff, der 4 Filovirus-GP's exprimiert (ZEBOV, SEBOV, Marburg, Tai Forest); 2 Teilpfimpfungen gesamt

68

rVSV chimerischer Impfstoff

69

Efficacy and effectiveness of an rVSV-vectored vaccine in preventing Ebola virus disease: final results from the Guinea ring vaccination, open-label, cluster-randomised trial (Ebola Ça Suffit!)

Ana Maria Henao-Restrepo, Anton Camacho, Ira M Longini, Conall H Watson, W John Edmunds, Matthias Egger, Miles W Carroll, Natalie E Dean, Ibrahima Diatta, Moussa Doumbia, Bertrand Draguez, Sophie Duraffour, Godwin Enwere, Rebecca Grais, Stephan Gunther, Pierre-Stéphane Gsell, Stefanie Hossmann, Sara Viksmoen Watle, Mandy Kader Kondé, Sakoba Kâtia, Souleymane Kone, Eewa Kuisma, Myron M Levine, Sema Mandal, Thomas Mauget, Gunstein Norheim, Ximena Riveros, Aboubacar Soumah, Sven Trelle, Andrea S Vicari, John-Arne Røttingen*, Marie-Paule Kieny*

Findings In the randomised part of the trial we identified 4539 contacts and contacts of contacts in 51 clusters randomly assigned to immediate vaccination (of whom 3232 were eligible, 2151 consented, and 2119 were immediately vaccinated) and 4557 contacts and contacts of contacts in 47 clusters randomly assigned to delayed vaccination (of whom 3096 were eligible, 2539 consented, and 2041 were vaccinated 21 days after randomisation). No cases of Ebola virus disease occurred 10 days or more after randomisation among randomly assigned contacts and contacts of contacts vaccinated in immediate clusters versus 16 cases (7 clusters affected) among all eligible individuals in delayed clusters. Vaccine efficacy was 100% (95% CI 68.9–100.0, $p=0.0045$), and the calculated intraclass correlation coefficient was 0.035. Additionally, we defined 19 non-randomised clusters in which we enumerated 2745 contacts and contacts of contacts, 2006 of whom were eligible and 1677 were immediately vaccinated, including 194 children. The evidence from all 117 clusters showed that no cases of Ebola virus disease occurred 10 days or more after randomisation among all immediately vaccinated contacts and contacts of contacts versus 23 cases (11 clusters affected) among all eligible contacts and contacts of contacts in delayed plus all eligible contacts and contacts of contacts never vaccinated in immediate clusters. The estimated vaccine efficacy here was 100% (95% CI 79.3–100.0, $p=0.0033$). 52% of contacts and contacts of contacts assigned to immediate vaccination and in non-randomised clusters received the vaccine immediately; vaccination protected both vaccinated and

Lancet, 2016

70

Ebola-Impfeinsatz DRC

- rVSV-ZEBOV-GP Impfstoff:
 - 8.8.2018 bis 2.2.2020: 283.117 Personen geimpft
 - HCW's, Kontaktpersonen, front line workers, 3rd line contacts
 - Tw. auch postexpositionell eingesetzt
 - Feldeffektivität rd. 97%
- Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo
 - Seit 14.11.2019 in Goma, 9.715 geimpft

71

Nebenfront: neue Therapeutika

REGN-EB3

- REGN-EB3 was invented by Regeneron using its VelociSuite® technologies; the therapy combines three fully-human monoclonal antibodies. REGN-EB3 has received orphan drug designation from both the FDA and the EMA. It is being developed, tested and manufactured as part of an agreement established in 2015 with the Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), part of the Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response at the U.S. Department of Health and Human Services (HHS). REGN-EB3 is currently under development and its safety and efficacy have not been fully evaluated by any regulatory authority.

mAb114

- mAb114 is a monoclonal antibody that is being evaluated as a treatment for Ebola virus disease. It is based on antibodies originally derived from the blood of a survivor of Ebola virus disease who contracted the disease in Kikwit in 1995. In early 2018, a Phase I clinical trial of mAb114 was conducted by the NIH Vaccine Research Center Clinical Trials Program led by Julie E. Ledgerwood. mAb114 is also being evaluated during the 2018 North Kivu Ebola outbreak (PALM trial). mAb114 has shown great success in lowering the mortality rate from 90% to about 34%.

72

CHIKUNGUNYA

73

CHIKUNGUNYA

- Alphavirus aus der Familie der Togaviren
- 1952 erstmals in Tansania beschrieben, Erstepidemie aber vermutlich 1823/1827 (Tanzania – Karibik – Südamerika)
- Übertragung durch (tagaktive) Aedes und Culexarten, hauptsächlich Ausbrüche nach der Regenzeit (hohe Mückendichte)
- Inkubationszeit: 2-4 Tage
- Hauptbeschwerden sind
 - Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen
 - Hohes Fieber
 - Hautrötung (flächig)
- Krankheitsdauer:
 - Akute Phase rund eine Woche
 - Postinfektiös: 25% aller Patienten haben schwere Gelenkschmerzen und Tendosynovitiden (davon 50% 1 Jahr, 12% bis 3 Jahre), Genese unklar (AK-Komplexablagerung?)
- Nur symptomatische Therapie möglich (fiebersenkend, antiphlogistisch)

74

75

Epidemiologie

- Rasante Ausbreitung von Chik auf dem amerikanischen Kontinent seit 12/2013
 - Alleine 2014 über 1,100.000 Fälle,
 - 2015 langsam abnehmend: ca 630.000 Fälle
 - 2016 gesamt ca. 350.000 Fälle
 - 2017 weitere deutliche Abnahme (rd. 125.000 Fälle)
 - 2018 wieder deutliche Zunahme in einigen Bundesstaaten in Brasilien
- Hauptverbreitungsgebiete ausserhalb des amerik. Kontinents:
 - Indien, Südostasien
- Gesamtzahl Neuinfektionen pro Jahr: geschätzt auf 50-100 Mio

76

CHIK-Epidemiologie 2018

Amerika

- Brasilien 65.000
- Kolumbien, Costa Rica, El Salvador, Mexico, Nicaragua, Paraguay:
wenige bis einige hundert Fälle

Asien

- Indien 47.000 (Verdacht)
- Thailand: 3.500

Afrika

- Sudan 20.000

77

Geographical distribution of chikungunya cases reported worldwide, 2018

Date of production: 22/01/2019

78

CHIK-Epidemiologie 2019

Amerika

- Brasilien **120.000**
- Kolumbien, Costa Rica, El Salvador, Mexico, Nicaragua, Paraguay:
wenige bis einige hundert Fälle

Asien

- Indien noch keine Daten 2019
- Thailand: **11.000** (v.a. Süden!)
- Malediven: 1.400

Afrika

- Äthiopien **50.000**

79

Geographical distribution of chikungunya cases reported worldwide in all 2019

Chikungunya virus disease cases
1
100
100.000
Affected territories

„hot spots“:
Brasilien ca 175.000
Thailand: 11.500
Sudan: > 50.000

Date of production: 15/01/2020

80

80

Chikungunya Deutschland Importe

Infektionsland	Nennungen	Anteil
Kenia	9	30%
Thailand	4	13%
Brasilien	2	7%
Indien	2	7%
je eine Nennung: Ägypten, Eritrea, Tansania, Dominikanische Republik, Indonesien, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Singapur, Neuseeland	10	33%
Ausland, Land unbekannt	3	10%
Summe	30	100%

Tab. 6: Chikungunya in Deutschland 2018 – genannte Infektionsländer, IFSG-Meldedaten (Angaben für 26 Erkrankungen, Mehrfachnennungen möglich)
Abb. 7: Chikungunya in Deutschland 2006–2018, IFSG-Meldedaten

EpiBull RKI 48/2019

81

Chikungunya in Europa

- *Aedes aegypti* in Europa nicht heimisch
- In Europa heimische *Aedes albopictus* („Tigermücke) bisher als Überträger ungeeignet
- Virale Mutante (Punktmutation (1 Aminosäure!)) vom Ind.Subkontinent an *A. albopictus* adaptiert
- Seither mehrfach nach Importen lokale Ausbrüche in Südeuropa
- Relevanz: durchaus ernstzunehmen bei Reisenden aus Endemiegebieten

Rezza et al, Lancet 2007

82

Distribution of *Aedes albopictus* in Europe, 2019

83

Aedes albopictus-Ausbreitungstrend

Figure 1. *Aedes albopictus* vectorial capacity trend in southern Europe. In black, the modelled average VC of *Aedes albopictus* from 1979-2018 is shown for the European regions that have experienced local autochthonous transmission of dengue or chikungunya since 2007. The locally estimated scatterplot smoothed (LOESS) trend is shown in blue. This includes all regions along the Mediterranean Coast in Southern continental Europe between Croatia, Italy, France and Spain. (A) The timeline of recent dengue cases is shown in the bar graph, labelled with case numbers per country. The 2012 Madeira and the 2009 and 2018 Réunion dengue outbreaks are not included given the climatic and ecological differences between these islands and continental Europe. (B) The timeline of recent chikungunya cases is shown in the bar graph, labelled with case numbers per country. Again, past chikungunya outbreaks in Réunion are not included.

Lillepold et al, JTM 2019

84

Chikungunya in Europa

- *Aedes aegypti* in Europa nicht heimisch
- In Europa heimische *Aedes albopictus* („Tigermücke) bisher als Überträger ungeeignet
- Virale Mutante (Punktmutation (1 Aminosäure!)) vom Ind.Subkontinent an *A. albopictus* adaptiert
- Seither mehrfach nach Importen lokale Ausbrüche in Südeuropa
- Relevanz: durchaus ernstzunehmen bei Reisenden aus Endemiegebieten

Rezza et al, Lancet 2007

85

CHIK Ausbrüche in Europa per 10/2018 (ECDC RRA)

Year	municipalities	Typology of areas of transmission	Number of cases	Period	Likely origin of the strain	CHIKV genotype	Reference
2007	Italy, region of Emilia Romagna, main transmission areas in Castiglione di Cervia and Castiglione di Ravenna villages.	Rural villages	≈ 330 suspected and confirmed cases	July–September	India	ECSA E1-A226V CHIKV strain (with mutation)	[40,49]
2010	France, Var department, Fréjus city	Urban/sub-urban	Two cases	September	India	ECSA E1-A226 CHIKV strain (without mutation)	[33,50]
2014	France, Hérault department, Montpellier	Urban/sub-urban	Eleven cases	September–October	Cameroon	ECSA E1-A226V CHIKV strain (with mutation)	[51]
2017	France, Var department, Le Cannet-les-Maures	Small town in rural area	As of 3 October, 17 cases: eleven in Cannet-des-Maures and six in Taradeau	July–October	Central Africa	ECSA E1-A226V CHIKV strain (with mutation)	[29,52]
2017	Italy, Lazio region, Anzio, Latina and Rome and Calabria region (Guardavalle marina)	Urban/sub-urban with commuting	As of 4 October, 239 cases in the Lazio region and six cases in Guardavalle Marina.	August–October	In Lazio: Asia (India/Pakistan) In Calabria: ongoing	In Lazio: ECSA E1-A226 CHIKV strain (without mutation) In Calabria: ongoing	[26,53]

86

Impfstoffe

87

Table 1. CHIKF vaccines in late preclinical or clinical development.

Vaccine name	Developer	Vaccine type	Doses required/ tested	Current stage of testing (clinicaltrials.gov identifier)
TSI-GSD-218 (181/ clone25)	United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases, University of Maryland	Live-attenuated CHIKV strain	1	Completed Phase 2
VRC-CHKVLP059-00-VP (PXVX0317 CHIKV-VLP)	US National Institutes of Health, PaxVax	Virus-like particle assembled from CHIKV proteins expressed in mammalian cells	2	Phase 2 (NCT02562482, NCT01489358, NCT03483961)
MV-CHIK	Inst. Pasteur, Themis Bioscience	Recombinant live- attenuated measles vaccine expressing CHIKV virus-like particles derived from the structural protein genes	2	Phase 2 (NCT03101111, NCT02861586)
VLA1553	Valneva, Austria	Recombinant CHIKV with nsP3 deletion	1	Recruiting for Phase 1 (NCT03382964)
VAL-181388	Moderna Therapeutics	mRNA encoding the CHIKV structural proteins	Not reported	Recruiting for Phase 1 (NCT03325075)
pMCE321	University of Pennsylvania, Philadelphia	Structural protein genes E3, E2, and E1 linked in a single DNA construct with furin cleavage sites between them	3	Late preclinical (immunogenicity and efficacy in mice, immunogenicity in NHPs)
CHIKV/IRES	University of Texas Medical Branch, Takeda Pharmaceuticals	Recombinant CHIKV with subgenomic promoter replaced by internal ribosome entry site to down-regulate structural proteins and prevent mosquito infection	1	Late preclinical (immunogenicity and efficacy in mice, NHPs)
EILV/CHIKV	University of Texas Medical Branch	Recombinant Eilat/chikungunya chimeric virus that is replication-defective in vertebrate cells	1	Late preclinical (immunogenicity and efficacy in mice, NHPs)

Abbreviations: CHIKF, chikungunya fever; CHIKV, chikungunya virus; EILV, Eilat virus; NHP, nonhuman primate; nsP3, nonstructural protein 3.

<https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0006919.t001>

Rezza et al, PlosNeg.TropDis, 2019

88

Chikungunya Vaccine – MV-CHIK

- Measles Virus (MV) Vector based on the Schwarz vaccine strain
- MV-CHIK expressing full subgenomic open reading frame (ORF) encoding for the Chikungunya Virus structural genes (La Reunion Strain-06-46):
 - CE3E26KE1: Capsid, Envelope 3/2/1, 6k (3.7 kb)
- CHIKV E1 and E2 proteins comprise the epitopes to elicit protective humoral and cellular responses
- Recombinant virus is fully replication competent and growth is not impaired due to antigen expression

REF: Brandler S, et al 2013

E. Tauber, 2016

89

MV-CHIK Phase II-Zusammenfassung

- Alle Geimpften entwickelten Antikörper gegen CHIK, SCR um 86,4%-100% nach 2. Immunisierung
 - Höhere Dosierungen allgemein immunogener
- Prime-boost (d 28 und 196) besser immunogen als konventionell (d 0-28)
- Vorbestehende Masernimmunität beeinflusste Immunogenität nicht
- Masern-Ak Titer steigen ebenfalls an
- Verträglichkeit ohne Auffälligkeiten

Reisinger et al, Lancet 2018

90

ZIKV/CHIK Kombiimpfung

- rVSV basierte Vektorvaccine
- Basiskonstrukt ähnlich wie rVSV-Ebola
- Im Tierversuch 100% effektiv

A

Fig. 6. Survival of mice vaccinated with a single dose of VSV Δ G-CHIKV-ZIKV (filled square) or PBS (open square), and challenged (i.v.) with 10⁶ PFU of CHIKV (18 days).

Chattopadhyay et al, Vaccine, 2018

91

Dengue

92

Dengue-epidemiolog. Entwicklung

Figure 3: Change in disability-adjusted life-years for dengue since 1990 in dengue-endemic countries

Stanaway et al LID, 2016

93

Dengue 2013: Inzidenz/100.000

Shepard et al, LID, 2016

94

Dengue 2017 - 2018

- Sri Lanka > 185.000 Neuerkrankungen (x4)
- Laos ca. 11.000 (x2)
- Vietnam ca 184.000 (x2)
- Thailand: höchste Zahlen seit 20 Jahren: 51.000
- Malaysia: 82.000
- Philippinen: 131.000 (Abnahme gegen 2016)
- Indien: Kerala, Tamil Nadu, Karnataka hauptbetroffen, ca. 155.000 (x3-5)
- Nicaragua ca 32.000 (x2)
- Sri Lanka: 52.000
- Kambodscha: 15.000
- Thailand: 80.000
- Bangladesh: 10.000
- Malaysia: 80.000
- Indien: 90.000
- La Reunion: 6.700
- Amerika: 534.000 Fälle, davon ca.
 - 250.000 Brasilien,
 - 80.000 Mexico,
 - 60.000 Nicaragua
- EU: Spanien, Frankreich autochthone Fälle

95

Geographical distribution of dengue cases reported worldwide, 2018

96

Dengue: 2018 - 2019

- Sri Lanka: 52.000
 - Kambodscha: 15.000
 - Myanmar: ca.75.000
 - Thailand: 80.000
 - Philippinen: 150.000
 - Malaysia: 80.000
 - Indien: 90.000
 - Bangladesh: 10.200
 - La Reunion: 6.700
 - Amerika: 534.000 Fälle, davon ca.
 - 250.000 Brasilien,
 - 80.000 Mexico,
 - 60.000 Nicaragua
 - EU: Spanien, Frankreich autochthone Fälle
- Sri Lanka **55.000**
 - Kambodscha: **56.000**
 - Myanmar: **120.000**
 - Thailand: **125.000**
 - Philippinen: **325.000**
 - Malaysia: **105.000**
 - Indien: noch keine Zahlen
 - Bangladesh: **> 100.000**
 - Amerika: **2,800.000**, davon ca.
 - **2,100.000** Brasilien
 - **215.000** Mexico
 - **160.000** Nicaragua
 - **95.000** Honduras
 - **105.000** Kolumbien
 - EU: Spanien, Frankreich

97

Geographical distribution of dengue cases reported worldwide, August to October 2019

98

Dengue S-Amerika: (PAHO, 2019)

Figure 1. Reported number of dengue cases and the proportion of severe dengue cases, by year of report. Region of the Americas, 1999-2019 (up to EW 22).

99

Dengue-Importe Europa (2018) n=2191; conf. N=2033

100

Dengue-Deutschland

Importländer 2018

Abb. 8: Denguefieber in Deutschland 2001–2018, IfSG Meldedaten

RKI, EpiBull 48/2019

101

Impfstoffe

102

Dengue-Impfstoffe in klinischer Entwicklung (8/17)

Candidate vaccine name	Manufacturer/ Developer	Vaccine type/platform	Antigen	Adjuvant	Most advanced trial phase
CYD-TDV (Dengvaxia [®])	Sanofi Pasteur	Live, recombinant (based on a yellow fever vaccine 17D backbone)	DENV-1-4 prM/E	None	Licensed
TV003 TV005	Butantan Institute	Live, attenuated and recombinant (DENV-2 in DENV-4 backbone)	DENV-1,3,4 whole genome, DENV-2 prM/E	None	Phase III
TDV (also referred to as TAK-003)	Takeda	Live, attenuated and recombinant (DENV-1/3/4 in DENV-2 backbone)	DENV-2 whole genome, DENV-1,3,4 prM/E	None	Phase III
TDENV-PIV	GSK/WRAIR/ Fiocruz	Inactivated	DENV-1-4 whole genome	AS03	Phase II
TDENV-LAV + TDENV-PIV	WRAIR	Live, attenuated and inactivated (heterologous prime-boost)	DENV-1-4 whole genome	Alum (with PIV)	Phase I
V180	Merck	Recombinant subunit (non-VLP)	DENV-1-4 E protein	ISCOMATRIX	Phase I
TVDV	NMRC	DNA	DENV-1-4 prM/E	Vaxfectin	Phase I

103

Konstruktions- unterschiede

- **CYD Sanofi:** Chimärenvakzine, lebend, Gelbfieber backbone, prM (precursor membrane) und E (envelope) Gensegmente eingefügt
- **LATV (NIH):** attenuiert, lebend, Gemisch von 4 rekombinanten Dengievirus-Genomen, DENV2 ist chimerisch von DEN4, 30 Nukleotide entfernt (Virulenzverlust), ebenfalls prM und E Gensegmente.
- **DENVax Takeda:** 4 rekombinante DENV2 Viren, mit prM und E der anderen Stämme

Screaton et al, Nature Rev. Immunol., 2015

104

DENGVAXIA[®]

Impfstoff:

- chimärer (YF-17D), attenuierter, tetravalenter-Dengue-Lebendvirus-Impfstoff (CYD-TDV, Sanofi-Pasteur)
 - Zulassung in 20 Ländern, z.B. Mexico, Brasilien, El Salvador, Paraguay und auf den Philippinen
 - Zulassung durch EMA mit 12/2018
- Nur Altersgruppe 9 - 45 a
- Dreimalige subkutane Impfung: Monat 0 - 6 - 12

105

106

107

Dengvaxia: WHO statements

Daten...

- In areas of 70% dengue seroprevalence at age 9 years, over a 5-year follow-up period, for every 1 excess case of hospitalized dengue in vaccinated seronegative individuals, 7 hospitalized dengue cases would be prevented in vaccinated seropositives; and for every 1 excess severe dengue case in vaccinated seronegatives, 4 severe cases would be prevented in vaccinated seropositives.
- In areas of 80% dengue seroprevalence at age 9 years, over a 5-year follow-up period, for every 1 excess case of hospitalized dengue case in vaccinated seronegative individuals, 13 hospitalized dengue cases would be prevented in vaccinated seropositives; and for every 1 excess severe dengue case in vaccinated seronegatives, 7 severe cases would be prevented in vaccinated seropositives.

Spezifische Einschätzung Nutzen/Risiko

- In individuals seropositive before vaccination, the incidence of severe dengue was 1 per 1000 when vaccinated and 4.8 per 1000 when not vaccinated (benefit).⁴⁵
- In individuals seronegative before vaccination, the incidence of severe dengue was 4.0 per 1000 when vaccinated and 1.7 per 1000 when not vaccinated (harm).⁴⁵

WHO, Dengue PP; WER 9336, 2018

108

DENGVAXIA®

- Reisemedizin:** (Denkbarer) Einsatz
- bei Personen mit nachgewiesener Dengue-Erstinfektion und erneuter Reise in hochendemische Gebiete, insbesondere bei Langzeitaufenthalt
 - Lange Vorlaufzeit durch Impfschema nötig!!
 - Sehr restriktive Indikationsauslegung in der SPMC

109

Dengvaxia - SPMC

4.1 Therapeutic indications

Dengvaxia is indicated for the prevention of dengue disease caused by dengue virus serotypes 1, 2, 3 and 4 in individuals 9 to 45 years of age with prior dengue virus infection.

Previous dengue infection has to be assessed before vaccination. This can be done by a history of dengue or through an appropriately validated serological test.

Immunisation should be carried out by subcutaneous injection in the upper arm in the region of deltoid.

Do not administer by intravascular route.

Travellers

There are no data to support vaccination of individuals living in non-endemic areas, therefore vaccination of these individuals is not recommended.

Dengvaxia should not be used in the context of dengue outbreak in non-endemic regions.

As a live attenuated vaccine, therefore Dengvaxia is contraindicated during pregnancy (see section 4.3).

**DAHER:
KEINE AUSLIEFERUNG IN EU!**

110

Takeda-Denguevakzine TAK-003

Efficacy of a Tetravalent Dengue Vaccine
in Healthy Children and Adolescents

Shihadas Bowal, M.D., Humberto Reynales, M.D., Ph.D.,

This article was published on November 6,
2019, at NEJM.org.

- Phase III mit rd.20.000 Personen, 4-16 Jahre, RCT, 2:1
- 26 sites, S-Amerika, Sri Lanka, Philippinen, Thailand
- 2 Impfungen im Dreimonatsabstand
- Studienziel:
 - Effektivität bezogen auf Personenjahre (follow up Teil 1: 12 Monate, Teil 2: 6 Monate und Teil 3: 3 Jahre (ongoing))
 - Sicherheit

111

Takeda-Denguevakzine TAK-003

Efficacy of a Tetravalent Dengue Vaccine
in Healthy Children and Adolescents

Shihadas Bowal, M.D., Humberto Reynales, M.D., Ph.D.,

This article was published on November 6,
2019, at NEJM.org.

Table 2. Vaccine Efficacy against Any Dengue Virus Serotype.

End Point and Population	Incidence				Vaccine Efficacy (95% CI) %
	Vaccine Group		Placebo Group		
	no./total no. (%) ^a	cases/100 person-yr	no./total no. (%) ^a	cases/100 person-yr	
Primary end point: virologically confirmed dengue from 30 days after second dose to end of part 1 of trial					
All participants in per-protocol population [†]	61/12,700 (0.5)	0.5	149/6316 (2.4)	2.6	80.2 (73.3 to 85.3)
Virologically confirmed dengue from first dose to end of part 1 of trial					
All participants in safety population [‡]	78/13,380 (0.6)	0.5	199/6687 (3.0)	2.5	80.9 (75.2 to 85.3)
Cases contributing to primary end point (per-protocol population)					
Virologically confirmed dengue					
Baseline serostatus [§]					
Seropositive	41/9165 (0.4)	0.5	110/4587 (2.4)	2.7	82.2 (74.5 to 87.6)
Seronegative	20/3531 (0.6)	0.6	39/1726 (2.3)	2.5	74.9 (57.0 to 85.4)
Dengue virus serotype					
DENV-1	16/12,700 (0.1)	0.1	30/6316 (0.5)	0.5	73.7 (51.7 to 85.7)
DENV-2	3/12,700 (<0.1)	<0.1	64/6316 (1.0)	1.1	97.7 (92.7 to 99.3)
DENV-3	39/12,700 (0.3)	0.3	51/6316 (0.8)	0.9	62.6 (43.3 to 75.4)
DENV-4	3/12,700 (<0.1)	<0.1	4/6316 (0.1)	<0.1	63.2 (-64.6 to 91.8)
Age group					
4-5 Yr	13/1619 (0.8)	0.9	23/801 (2.9)	3.2	72.8 (46.2 to 86.2)
6-11 Yr	34/7009 (0.5)	0.5	85/3491 (2.4)	2.7	80.7 (71.3 to 87.0)
12-16 Yr	14/4072 (0.3)	0.4	41/2024 (2.0)	2.2	83.3 (69.3 to 90.9)

112

Takeda-Denguevaccine TAK-003

Efficacy of a Tetravalent Dengue Vaccine
in Healthy Children and Adolescents

Shihadas Biswal, M.D., Humberto Reynales, M.D., Ph.D.

This article was published on November 6,
2019, at NEJM.org.

B Virologically Confirmed Dengue Leading to Hospitalization

No. of Participants

Placebo						
Seronegative	1832	1827	1780	1776	94	7
Seropositive	4852	4823	4710	4700	220	6
Vaccine						
Seronegative	3714	3693	3640	3635	157	10
Seropositive	3661	3599	3449	3435	417	10

113

Takeda-Denguevaccine TAK-003

Efficacy of a Tetravalent Dengue Vaccine
in Healthy Children and Adolescents

Shihadas Biswal, M.D., Humberto Reynales, M.D., Ph.D.

This article was published on November 6,
2019, at NEJM.org.

Table 3. Safety Analysis (Safety Population).^o

Adverse Event	Vaccine Group (N = 13,380)	Placebo Group (N = 6687)
Serious adverse event — no. (%)	409 (3.1)	255 (3.8)
Serious adverse event not related to vaccine or placebo — no. (%) †	408 (3.0)	251 (3.8)
Serious adverse event related to vaccine or placebo — no. (%) †	1 (<0.1)	4 (0.1)
Serious adverse event leading to withdrawal of vaccine or placebo or to trial discontinuation — no. (%)	18 (0.1)	8 (0.1)
Death — no. (%)	4 (<0.1)	1 (<0.1)
Death related to vaccine or placebo — no. (%)	0	0

114

Bisherige Ergebnisse Takeda-Denguevaccine

- Dosierung
2 x sc 0-3 Monate
Schutzwirkung 1 Dosis?
- Nach 18 Monaten efficacy (n=1.800; DEN-204)
RR symptomatische DEN-Erkrankung 0.29
alle 4 Serotypen abgedeckt (Kinder, Adoleszente)
- W: 2%, kein Hinweis auf schwere NW

Saez-Llorens X et al. Lancet Infect Dis. 2017 Nov 6. pii:S1473-3099(17)30632-1.

115

Vergleich der drei Vakzinen

Status	CYD-TDV (Sanofi Pasteur) Licensed	TDV (Takeda) Phase 3	TV003 (Butantan) Phase 3
# Doses	3 doses over 12 months (0, 6, 12)	2 doses 3 months apart	1 dose
Indicated age	9 - 45	Phase 3: age range 4 - <16	Phase 3: age range 2 - 59
Construct	Yellow fever 17D backbone	DENV-2 backbone	Full-length genomes for DENV-1, -3 and -4. Backbone for DENV-2: DENV-4
# DENV proteins	8	16	32

116

West Nil Virus

117

West Nil Virus

- Erste berichtete Epidemie in Israel in den 1950ern
- Bald als eines der meist verbreiteten Flaviviren identifiziert
- Vorkommen in Afrika, Westasien, Europa und dem Nahen Osten
- Wildlebende (Wasser)-Vögel sind die wichtigsten Überträger und Zugvögel spielen eine entscheidende Rolle in der Ausbreitung des Virus und der Wiedereinführung in die nördlichen Breiten
- 1996: Epidemie in Rumänien; 450 Personen wurden infiziert, 39 Todesfälle
- 1999: Ausbruch in New York, USA; ca. 8.200 Infektionen mit 59 schweren Fällen von Enzephalitis und aseptischer Meningitis sowie 7 Todesfällen

118

*West Nil Virus

- ss RNA Arbovirus (arthropod-borne)
- Flavivirus
- Vektor: Stechmücken (Culex spp., Aedes)
- Erstisolierung 1937 in Uganda
- Übertragung aber auch durch Blutprodukte, Transplantationen, über die Plazenta,
- Reservoir: Vögel, Säugetiere

C. pipiens

119

119

*West Nil Virus

- Inkubationszeit: 2-14 Tage
- >80% asymptomatisch
- 20% komplikationslose febrile Erkrankung, selbstlimitierend, „grippaler Infekt“:
Plötzlicher Beginn, Fieber, teils papuläres Exanthem (Oberkörper, obere Extremitäten), Kopfschmerzen, Muskelschwäche, Myalgie, gastrointestinale Symptome
- Krankheitsdauer bis 3 Wo., üblicherweise restituito
- DG: Frühphase PCR; AK-ELISA: IgM, später IgG AK, Verlauf!!; störanfällig (Flaviviren); PRNT (spezifisch!)
- anzeigepflichtig

120

120

*West Nil Virus

● 1/150 Infizierten: ZNS Beteiligung (neuroinvasiv)

Fieber, Kopfschmerzen, Photophobie, Verwirrtheit
Meningitis, Enzephalitis, akut schlaffe Paralyse (asym. Schwäche, Reflexe abw.)

in 70% bleibende neurologische Defizite

2-18% der Fälle letal (fast immer Personen 65+)

Risikofaktoren für ZNS Beteiligung:

- Alter
- Immunsuppression
- Männer
- Diabetes mellitus
- Alkoholismus

121

121

*West Nil Virus

Therapie: symptomatisch

- Analgetika, Antiemetika, Antiepileptika, Rehabilitation

Spätfolgen:

- Müdigkeit, Schwäche
- Myalgie, Arthralgie, Kopfschmerz, neurologische Kompl. (Depressio, Tremor, Konzentrationsstörungen...)

122

122

WNV in Europa

- Erstbeschreibung in den 1960ern
- Wiederauftreten 1996 mit großem Ausbruch in Rumänien
- Seit 2003 regelmäßig in Vogelpopulationen nachgewiesen und später auch bei Menschen
- Langsame Fallzunahme und Ausbreitung seit 2011
- 2018 bis Oktober bereits mehr Fälle als 2017
- In vielen klassischen Urlaubsgebieten (z.B. Veneto)

123

WNV – emerging disease in Europa in der Zukunft?

Reported cases of West Nile fever for the EU and neighbouring countries
Transmission season 2012; latest update: 30/11/2012

2012 z.B:
GR: 161
I: 50
H: 12
RO:14
SRB: 70

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/west_nile_fever/Pages/index.aspx

2012: EU: 312 Fälle

124

124

WNV 2018 Europa: 1.503 Fälle, 177 Tote

125

WNF in Europa 2010-2018

Figure 1. Human WNF and WNND cases in Europe since 2010. Data are taken from the European Centre for Disease Prevention and Control.³

Barrett, JTM 2018

126

WNV-Saisonale Verteilung

Number of WNV infections in EU/EEA and EU enlargement countries by epidemiological week of notification*, 2014-2018.

* Week of notification to national authorities or if missing, week of notification to ECDC.

ECDC, 2018

127

WNV in Europa: Ländersituation

- Italien: starker focus im Norden, seit 2012 auch Foggia und Matera im Süden
- Griechenland: ständige landesweite Zunahme; Übertragung auch in Athen
- Rumänien: Südosten und zentrale Landesteile, sowie Bukarest
- Ungarn: kleine foci landesweit
- Kroatien: seit 2012 Meldungen, auch aus Zagreb
- Aktivität auch in Frankreich, Österreich, Bulgarien, Slowenien und Tschechische Republik
- Aktivität des WNV v.a. durch Ausbrüche bei Pferden dokumentiert, darunter auch in D

128

WNV – Saison 2019: per 31.10.: 456 Fälle, 47 Tote

129

Anforderungen an ideale WNV-Humanvakzine

- Besonders gute Immunogenität bei Älteren (schwerer KH-Verlauf; Immunoseneszenz)
 - Sowohl neutralisierende AK als auch starke T-Zell Antwort gefordert (CD8+T-Zellen!)
- Langdauernde Immunität erwünscht (compliance!)
- Hohe Sicherheit:
 - Reversion bei Lebendimpfstoff ausgeschlossen
 - Gute Verträglichkeit bei Älteren, Immunsupprimierten etc.
 - Geringe Infektiosität für Moskitos

130

Human WNV-Kandidatvakzinen

Vaccine	Developer	Vaccine Type	WNV Strain	Clinical Trial (Onset)	Clinical Trial Number	Dose and Route	Dosing Series
¹ VRC 302	NIAID Vaccine Research Center	prME DNA with ¹ CMV or ² CMV/R promoter	NY99	Phase I (2006)	¹ NCT00106769 ² NCT00300417	4 mg i.m.	Three doses four weeks apart
WN-80E	Hawaii Biotech	Recombinant, truncated E protein	NY99	Phase I (2008)	NCT00707642	5, 15, or 50 µg i.m.	Three doses four weeks apart
WN/DEN4A30	NIAID Division of Intramural Research	Chimeric, live virus with WNV prME and DENV-4 nonstructural genes with a 30 nt deletion	NY99	Phase I (2004) Phase I (2007) Phase I (2014)	NCT00094718 NCT00537147 NCT02186626	10 ³ , 10 ⁴ , or 10 ⁵ PFU s.c.	* One or two doses
HydroVax-001	Najit Technologies	Hydrogen peroxide-inactivated whole virus	Kunjin	Phase I (2015)	NCT02337868	1 or 4 µg i.m.	Two doses four weeks apart
Formalin-inactivated WNV	Nanotherapeutics Inc.	Formalin-inactivated whole virus	NY99	Phase I/II	none	1.25, 2.5, 5.0, or 10.0 µg i.m.	Two doses 21 days apart plus booster dose on day 180
ChimeriVax-WN02	Sanofi Pasteur	Chimeric, live virus with WNV prME and YFV 17D nonstructural genes with three site-directed mutations in the E protein	NY99	Phase I Phase II (2005) Phase II (2008)	none NCT00442169 NCT00746798	10 ³ , 10 ⁴ , or 10 ⁵ PFU s.c.	One dose

¹ Corresponds to the study NCT00106769 using the CMV promoter. ² Corresponds to the study NCT00300417 using the modified CMV/R promoter. * Although WN/DEN4A30 was tested in a two-dose regimen, one dose was found to provide better neutralizing antibody responses in older adults. NIAID = National Institute of Allergy and Infectious Diseases, CMV = cytomegalovirus, nt = nucleotide, i.m. = intramuscular, s.c. = subcutaneous.

Kaiser & Barrett, viruses, 2019

131

WNV/Dengue 4 3'Δ 30 chimeric virus vaccine

- Attenuiertes DEN-4 als backbone (NIAID)
- Ersatz des prM und E Strukturproteins des DEN-4 durch WNV Strukturproteine
- Phase I in jungen und älteren Freiwilligen abgeschlossen:
 - 2 Dosen, 10³ und 10⁴ PFU
 - Gute Immunogenität, AK-Persistenz über 1a
 - Gute Verträglichkeit, kein Hinweis auf Neuroinvasivität

132

ChimeriVax-WN02

- WNV NY99 (3 Mutationen im E-Protein enthalten) mit YF 17D Vektor
- Studie 1:
 - 1 Impfung mit $3,7 \times 10^{-5}$ PFU (18-40a; 41-64a; > 65a)
 - 96% SCR am Tag 28 im PRNT
 - Besonders in der älteren Gruppe hohe AK-Titer nach 1 Jahr
- Studie 2 (n=479; > 50a; 3 Dosierungen):
 - 1 Impfung
 - 92% SCR am Tag 28, GMT leicht dosisabhängig
 - Keinerlei Sicherheitsproblem, geringe NW-Quoten
- Scheint zulassungsfähig

133

Probleme für WNV-Impfstoffzulassung

- Konklusive Phase III Studien extrem schwierig:
 - Kurze Saison für WNV-Übertragung
 - Äußerst variable Epidemiologie
 - Von Jahr zu Jahr
 - Regional und subregional
 - Schlechte Kosten-Nutzen Relation

134

ZIKA

135

Zika: Grundlagen

- Arthropodenübertragenes Flavivirus
 - 1947 erstisoliert, Uganda (Zika forest)
 - Überträger: Aedes-Arten (auch *Ae.aegypti*, *Ae.albopictus* (!)),
 - Übertragung auch transplazentar oder perinatal möglich
 - Reservoir: zahlreiche Säugetierarten (inapparente Infektionen)
 - Zwei genetisch distinkte Linien: afrikanische und asiatische (dzt. epidemiologisch aktiv)
- Vor 2007 umschriebene Einzelausbrüche in Afrika und SO-Asien
- Nach 2007 mehrere Ausbrüche auf pazifischer Inseln
- 2015 Erstauftreten in S-Amerika

136

ZIKA-Epidemiologie

Musso et al, NEJM 2019

137

Zika: Verbreitung aktuell

138

ZIKA Verbreitung Ende 2018

World Map of Areas with Risk of Zika

Map Legend

- Area with current Zika outbreak
 - Country or territory that has ever reported Zika cases* (past or current)
 - US areas with sub-national information available
 - Areas with low likelihood of Zika infection because of high elevation (above 6,500 feet/2,000 meters)
 - Country with mosquito but no reported Zika cases*
 - Country or territory with no mosquitoes that spread Zika
- * Locally acquired, mosquito-borne Zika cases

<https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/zika-travel-information>, accessed 6/3/2019

139

Epikurve ZIKA

Vannice et al, Vaccine 2019

140

ZIKA-epidemiol. Resumee

- Trend: stark rückläufig in S-Amerika, langsam abnehmend in Mittelamerika
- Kumulative Zahlen per 1/18 (PAHO report):
 - Ca 580.000 Fälle gesichert
 - Ca 225.000 weitere Verdachtsfälle
 - 3.720 Fälle von congenitalen assoz. Missbildungen
 - 20 Todesfälle

141

ZIKA in Europa

- ❖ August 2019
Erstbeschreibung
- ❖ 3 autochthone Fälle
- ❖ Südfrankreich
- ❖ Hyères

Selbes Gebiet bereits früher betroffen von

- Dengue
- Chikungunya

A.albopictus präsent

Figure: The distribution of previously reported locally transmitted arbovirus cases in Europe and the predicted current and future distribution of their mosquito vector

Giron, Franke et al, Eurosurv. 2019

142

ZIKA Importe Deutschland

Infektionsland	Nennungen	Anteil
Kuba	8	44%
Deutschland	2	11%
je einmal: Dominikanische Republik, Brasilien, Malediven, Philippinen, Thailand, Ghana, Asien (ohne Land), Afrika (ohne Land)	8	44%
Summe	18	100%

Tab. 8: Zikavirus-Erkrankungen in Deutschland 2018 – genannte Infektionsländer, IfSG-Meldedaten (Angaben für 18 Erkrankungen)

RKI, EpiBull 48/2019

143

ZIKA-Übertragung

- Überwiegend Aedesarten (A.aegypti, A.albopictus, andere?)
- Sexuelle Übertragung: etwa 3% Anteil insgesamt
- Theoretische Übertragungsmöglichkeit: Blutkonserven
- R_0 gesamt liegt bei rund 2,05

Gao D et al, *Sci. Rep.* 6, 28070; doi: 10.1038/srep28070 (2016).

144

Übertragungswege AUSSER MÜCKEN: facts und Spekulationen...

Nachgewiesen wurde das Virus in

- Amnionflüssigkeit
- Muttermilch
- Urin
- Speichel
- Samen
- Blutprodukten

Nachgewiesen infektiös sind

- Samen
- Nachgewiesen ist die sexuelle Übertragung Mann-Frau und Mann-Mann
- Blutprodukte

Widersprüchliche Resultate gibt es bezüglich Infektiosität von

- Muttermilch
- Urin

Nicht schlüssig sind die Resultate für die Infektiosität von

- Speichel
- Transplantation
- Tierbissen
- Nadelstichverletzungen
- bei Laborarbeit

Grischott et al, Trav.Med.Inf.Dis.2016

145

Zika: Klinik

- IKZ 3-12 Tage
- 60-80% asymptomatisch (!!)
- Milde fieberhafte, selbstlimitierende Erkrankung von 4-7 Tagen Dauer, keine Komplikationen, kaum Todesfälle
 - Makulärer oder papulärer Hautausschlag
 - Konjunktivitis
 - Arthralgien, Myalgien
 - Seltener GI Symptome oder retrobulbäre Schmerzen

146

Impfstoffe

147

Entwicklungen

- Dzt. 45 verschiedene Vakzinen in Entwicklung
 - Inaktiviert
 - Attenuiert, lebend
 - Rekombinant (Subunit)
 - RNS, DNS
- Unterschiedliche Ansätze: Frauen vor/während Grav, Bevölkerung allgemein, outbreak control
- Problem: efficacy-Prüfung wg. abnehmender Endemizität

148

ZIKA - DNA Impfstoffe

- Plasmid VRC 5288 (ZIKA+JE Chimäre)
- Plasmid VRC 5283 (ZIKA Wildtyp, H/PF/2013 aus Frz.Polynesien)
 - DNA Impfstoff (einzelnes geschlossenes zirkuläres DNA-Plasmid)
 - Kodiert das precursortransmembrane M (prM) und Hüllprotein (E) eines ZIKV
- 4mg als Einzelimpfung oder 2x2mg, entweder per Nadel i.m. oder nadelfrei (Stratis Pharmajet), Schema 0-4-8 Wochen
- Reaktogenität: unauffällig
- Entwickler: VRC (Vaccine Research Center)/NIAID

Gaudinski et al, Lancet 2018

149

VRC study: Immunogenität

Figure 2: Neutralising activity 4 weeks after last vaccination, measured by reporter virus particle assay

Gaudinski et al, Lancet 2018

150

ZIKA: Impfstoffe - III

- mRNA-LNP (lipid nanoparticle encapsulated) Impfstoff
- Codiert prM-E GLP (ZIKA 2013)
- Erstversuche:
 - Im Mausmodell: 1x Immunisierung mit 30mcg mRNA-LNP's schützt bis 5 Monate später (challenge)
 - Im non-humanen Primatenmodell: 1x Immunisierung mit 50mcg schützt gegen challenge
 - In beiden Modellen hohe neutralisierende AK-Titer

Pardi et al, Nature, 2017

151

Nicht jedes Risiko ist kalkulierbar...

152